EDITAL N.º. 009, DE 01 DE AGOSTO DE 2025

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA OS CARGOS: TERAPEUTA OCUPACIONAL,
FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, EDUCADOR FÍSICO,
NUTRICIONISTA E TÉCNICO EM ÓRTESE E PRÓTESES**

CANDIDATO: _____

Questões Objetivas (1 – 20)

Prova Gabaritada de Conhecimentos Específicos para Fisioterapeuta em Centro Especializado em Reabilitação de Gurupi - CER

Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha e tem como objetivo avaliar os conhecimentos técnicos e teóricos necessários para a atuação de um fisioterapeuta em um ambiente de reabilitação. As questões abordam temas essenciais como **avaliação funcional, fisioterapia neurofuncional, fisioterapia musculoesquelética, reabilitação cardiorrespiratória** e a aplicação de **recursos eletrotermofototerapêuticos**.

Instruções:

- Leia atentamente cada questão.
- Escolha a única alternativa correta.

-
- 1. Qual das escalas de avaliação abaixo é mais adequada para mensurar a independência funcional em atividades de vida diária (AVDs) de um paciente com lesão neurológica?**
 - a. Escala de Fugl-Meyer
 - b. Escala de Berg
 - c. Medida de Independência Funcional (MIF)**
 - d. Teste de Caminhada de 6 Minutos
 - 2. A aplicação de ultrassom terapêutico, em modo contínuo, é contraindicada em qual das seguintes condições?**
 - a. Fibrose muscular
 - b. Tecido cicatricial
 - c. Sobre áreas de tumor maligno**
 - d. Tendinite crônica
 - 3. O principal objetivo da reabilitação pulmonar em um paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é:**
 - a. Aumentar a capacidade vital forçada.
 - b. Melhorar a força da musculatura inspiratória.
 - c. Aumentar a tolerância ao exercício e a qualidade de vida.**
 - d. Reduzir o risco de infecções pulmonares.

4. **A marcha festinante, caracterizada por passos curtos e acelerados, é um sinal motor típico de qual patologia neurodegenerativa?**
 - a. Esclerose Múltipla
 - b. Doença de Parkinson**
 - c. Acidente Vascular Cerebral (AVC)
 - d. Paralisia Cerebral

5. **Na fase de proliferação do processo de cicatrização de um tecido mole, o principal evento fisiológico é:**
 - a. A resposta inflamatória aguda.
 - b. A formação de tecido de granulação e neovascularização.**
 - c. A remodelação das fibras de colágeno.
 - d. A contração da cicatriz e o aumento da resistência tecidual.

6. **Em um paciente submetido à artroplastia total de joelho, qual conduta fisioterapêutica é considerada prioritária na fase inicial do tratamento?**
 - a. Treino de marcha em terrenos irregulares.
 - b. Ganho de amplitude de movimento em extensão e flexão.**
 - c. Fortalecimento muscular com alta carga.
 - d. Exercícios pliométricos.

7. **A marcha ceifante, com abdução do membro inferior durante a fase de balanço, é frequentemente observada em pacientes com:**
 - a. Síndrome de Guillain-Barré
 - b. Miastenia Gravis
 - c. Hemiparesia pós-AVC**
 - d. Lesão do ligamento cruzado anterior

8. **O Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M) é um instrumento de avaliação utilizado, principalmente, para mensurar:**
 - a. Força muscular de membros inferiores.
 - b. Equilíbrio estático.
 - c. A capacidade aeróbica e funcional.**
 - d. Amplitude de movimento articular.

9. **Um programa de reabilitação cardíaca é contraindicado na presença de qual das seguintes condições?**
 - a. Angina estável
 - b. Pressão arterial sistólica acima de 200 mmHg em repouso**

- c. Infarto agudo do miocárdio há 4 meses
- d. Arritmias ventriculares controladas

10. Qual a principal função do músculo deltóide na biomecânica da articulação do ombro?

- a. Rotação interna
- b. Adução
- c. Abdução
- d. Rotação externa

11. A Escala de Ashworth Modificada é um instrumento de avaliação clínica utilizado para quantificar:

- a. O grau de força muscular.
- b. A intensidade da dor.
- c. O nível de espasticidade.
- d. A amplitude de movimento.

12. Em um paciente com amputação transfemoral, qual das seguintes condutas é essencial na fase pré-protética do tratamento fisioterapêutico?

- a. Iniciar o treino de marcha com a prótese definitiva.
- b. Realizar o fortalecimento e a dessensibilização do coto.
- c. Orientar o uso de bengalas em degraus.
- d. Treinar a adaptação à prótese em superfícies irregulares.

13. A Resolução COFFITO n.º 424/2013 estabelece que o fisioterapeuta é um profissional de saúde de primeiro contato. Isso significa que ele tem autonomia para:

- a. Realizar cirurgias de pequeno porte.
- b. Solicitar exames de imagem e prescrever medicamentos.
- c. Fazer o diagnóstico fisioterapêutico e planejar o tratamento sem necessidade de encaminhamento.
- d. Assinar atestados médicos.

14. A utilização de FES (Estimulação Elétrica Funcional) em um paciente com lesão neurológica pode ter como objetivo:

- a. Aumentar a dor crônica.
- b. Auxiliar na contração muscular para a realização de um movimento funcional.
- c. Diminuir a amplitude de movimento articular.
- d. Melhorar a circulação sanguínea em todo o corpo.

15. Qual dos seguintes recursos terapêuticos é mais indicado para o tratamento de edema pós-operatório em um membro inferior?

- a. Ultrassom contínuo
- b. Ondas curtas
- c. Corrente russa
- d. Compressão pneumática intermitente

16. A atuação do fisioterapeuta no período pré-operatório de uma amputação de membro inferior tem como principal objetivo:

- a. Ajudar o paciente a aceitar a amputação.
- b. Fortalecer a musculatura do membro contralateral e orientar sobre as fases da reabilitação.
- c. Adaptar o paciente a prótese.
- d. Treinar a marcha em degraus.

17. No contexto da reabilitação neurofuncional, a facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) é uma técnica utilizada para:

- a. Reduzir a espasticidade de forma permanente.
- b. Inibir a contração muscular.
- c. Promover a ativação de padrões de movimento funcionais.
- d. Aumentar a dor em pacientes crônicos.

18. Qual é a principal característica da marcha cerebelar, comum em pacientes com lesões no cerebelo?

- a. Passos curtos e arrastados.
- b. Base de apoio estreita e dificuldade de equilíbrio.
- c. Ataxia e base de apoio alargada.
- d. Oscilação do tronco e dificuldade em levantar o pé.

19. Um paciente com lesão medular alta (C5-C6) é capaz de realizar qual dos seguintes movimentos de forma independente?

- a. Extensão de punho e flexão de cotovelo.
- b. Flexão de dedos e extensão de cotovelo.
- c. Adução de ombro e flexão de dedos.
- d. Extensão de tronco e flexão de ombro.

20. A utilização de órteses em pacientes com lesões neurológicas, como o AFO (Ankle-Foot Orthosis), tem como principal objetivo:

- a) Fortalecer a musculatura do pé.
- b) Aumentar a sensibilidade.
- c) Facilitar a deambulação, auxiliando na dorsiflexão do pé.
- d) Reduzir a força muscular para evitar espasmos.